

レジメン名 EG

出典 J Clin Oncol 19:3103-3110

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患 乳がん
進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

1クール期間 21日 総クール数 PDまで
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満*	PLT	10万/mm ³ 未満
その他	※出典では3500/mm ³ 未満だが、医師と協議し上記で登録。		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
エビルピシン	90mg/m ² **	NS20mL	全開	d1
シクロホスファミド	600mg/m ²	NS100mL	15分	d1
※アントラサイクリン系薬剤未治療例ではエビルピシンの総投与量の上限値を900mg/m ² とする。他のアントラサイクリン系薬剤による前治療歴のある患者では、それをエビルピシンの総投与量に上乗せして900mg/m ² までとする。				

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
①アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg(15min)
②エビルピシン90mg/m ² +デキサート6.6mg+生食(100)20mL(全開)
③エンドキサン600mg/m ² +生食100mL(15min)
④生食50mL(フラッシュ用)