

レジメン名

AC

出典 J Clin Oncol 1990;8:1483-1491

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------

対象疾患

乳癌
<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
ANC	1500/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
その他			

1クール期間 21日

総クール数 4クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ドキソルビシン	60mg/m ²	輸液適量 計100mL	全開	day1
シクロホスファミド(エンドキサン)	600mg/m ²	輸液100mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレメタキオン・ホストメタキオン、 溶解液まで含む)
day1 ①アプレピタント 125mg 分1 ②アロキシ0.75mg/kg+デキサート9.9mg (30分) ③ドキソルビシン60mg/m ² +輸液適量(全開) ④エンドキサン600mg/m ² +輸液100mL (30分) ⑤生食50mL(全開)
day2-3 ①アプレピタント 80mg 分1