レジメン名

VNR

出典　ナベルビン使用ハンドブック2012年9月作成

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

乳がん

■進行・再発
□補助療法（術前・術後）
□
□

投与減量の基準

WBC	1000/mm^{3}未満		
ANC	500/mm^{3}未満※		
その他	※出典ではANC 1000/mm^{3}未満だが、制限が厳しいためGrade3の血液毒性として上記の値で登録。前コースに上記の基準にかかった場合、投与量を20mg/m^{2}に減量する方法もある。		

投与中止の基準

WBC	1000/mm^{3}未満※		
その他	※出典ではWBC 2000/mm^{3}未満だが、制限が厳しいためGrade3の血液毒性として上記の値で登録		

1クール期間　21日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　PDまで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
ビノレルビン（ロゼウス）	25mg/m^2	輸液75mL	10分以内	d1、8

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1、8
①生食50mL（ルート確保用）
②ロゼウス25mg/m^2＋輸液75mL（10分以内）
③生食50mL（フラッシュ用）