

レジメン名

weekly Trastuzumab+PTX

出典 N Engl J Med 2015;372:134-141.  
タキソール使用ガイド 2012年9月作成  
ハーセプチン適正使用ガイド2011年11月改訂

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

HER2過剰発現乳癌  
進行・再発  
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

1クール期間 7日  
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 12クール※

12クール終了後は  
ハーセプチンのみを3  
週ごとに14回投与

投与中止の基準

WBC	3000/mm3未満	Plt	7.5万/mm3未満
ANC	1500/mm3未満	Hb	10.0g/dL未満
その他	LVEFが50%未満に低下または前回比10%以上の低下		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
トラスツマブ	4mg/kg	NS250mL	90分	day1 (初回)
トラスツマブ	2mg/kg	NS250mL	30分	day1 (2回目以降)
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	輸液250mL	60分	day1
12クール終了後はハーセプチンのみを3週ごとに下記の投与量で14回実施				
トラスツマブ	6mg/kg	NS250mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②トラスツマブ+生食250mL(90分※) ※2回目以降は30分まで短縮可
③生食50mL(全開)
④ファミジン20mg+デキサト6.6mg+ホラミン5mg +生食100mL(30分)
⑤パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup> +輸液250mL(60min) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与
⑥生食50mL(全開)
12クール終了後 day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②トラスツマブ6mg/kg+生食250mL(30分)
③生食50mL(全開)