

レジメン名

triweekly Trastuzumab +DTX

出典 N Engl J Med 2011;365:1273-1283.
ハーセプチン適正使用ガイド2011年11月改訂

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

HER2過剰発現乳癌

- 進行・再発
 補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	Plt	7.5万/mm ³ 未満
ANC	1500/mm ³ 未満	Hb	10.0g/dL未満
その他	LVEFが50%未満に低下した場合または前回比10%の低下		

1クール期間 21日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数 4クール

4クール終了後はハーセプチンのみを3週ごとに14回投与

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
トラスツマブ	8mg/kg	NS250mL	90分	day1(初回)
トラスツマブ	6mg/kg	NS250mL	30分	day1(2回目以降)
ドセタキセル	75mg/m ²	輸液250mL	60分	day1
4クール終了後はハーセプチンのみを3週ごとに下記の投与量で14回実施				
トラスツマブ	6mg/kg	NS250mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②トラスツマブ+生食250mL(90分※) ※2回目以降は30分まで短縮可
③生食50mL(全開)
④デキサート9.9mg+ホウランミン5mg +生食100mL(30分)
⑤ドセタキセル75mg/m ² +輸液250mL(60分)
⑥生食50mL(全開)
day2-3 ①デカドロン 8mg 分2
4クール終了後 day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②トラスツマブ6mg/kg+生食250mL(30分)
③生食50mL(全開)