

レジメン名

triweekly Trastuzumab+TC

出典 Lancet Oncol 2013;14:1121-8.

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

HER2過剰発現乳癌
 進行・再発
 補助療法(術前(術後))

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
ANC	1500/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
その他	LVEFが50%未満に低下した場合または前回比10%の低下		

1クール期間 21日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数 4クール

4クール終了後はトラスツマブのみを3週ごとに14回投与

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
トラスツマブ	8mg/kg	NS250mL	90分	day1(初回)
トラスツマブ	6mg/kg	NS250mL	30分	day1(2回目以降)
ドセタキセル	75mg/m ²	輸液250mL	60分	day1
シクロホスファミド(エンドキサン)	600mg/m ²	輸液100mL	30分	day1
4クール終了後はハーセプチンのみを3週ごとに下記の投与量で14回実施				
トラスツマブ	6mg/kg	NS250mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②トラスツマブ+生食250mL(90分※) ※2回目以降は30分まで短縮可
③生食50mL(全開)
④アロキン0.75mg/kg+ドセタキセル13.2mg +ホウライミン5mg(30分)
⑤ドセタキセル75mg/m ² +輸液250mL(60分)
⑥エンドキサン600mg/m ² +輸液100mL(30分)
⑦生食50mL(全開)
day2-3 ①デキサメタゾン 16mg 分2
4クール終了後 day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②トラスツマブ6mg/kg+生食250mL(30分)
③生食50mL(全開)