

レジメン名

bevacizumab+PTX

出典 N Engl J Med 2007;357:2666-2676.  
タキソール使用ガイド 2012年9月作成

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患

**乳癌**

進行・再発  
 補助療法(術前/術後)

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	2000/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	10万/mm <sup>3</sup> 未満
ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満	Hb	8.0g/dL未満
その他			

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ベバシズマブ(アバステン)	10mg/kg	NS100mL	90分 (30分まで漸減可能)	day1、15
パクリタセル	90mg/m <sup>2</sup>	輸液250mL	60分	day1、8、15

1日投与順 (経時的にプレメイクーション・ポストメイクーション、 溶解液まで含む)
day1、15 ①生食50mL(ルート確保用)
②アバステン+生食100mL(90分※) ※2回目は60分、3回目以降は30分まで短縮可
③生食50mL(全開)
④ファモチジン20mg+デキサート6.6mg+ホラミン5mg +生食100mL(30分)
⑤パクリタセル90mg/m <sup>2</sup> +輸液250mL(60min) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与
⑥生食50mL(全開)
day8 ①ファモチジン20mg+デキサート6.6mg+ホラミン5mg +生食100mL(30分)
②パクリタセル90mg/m <sup>2</sup> +輸液250mL(60min) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与
③生食50mL(全開)