レジメン名

Pertuzumab＋Trastuzumab

出典　ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ適正使用ガイド2011年11月改訂
ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ適正使用ガイド2018年10月改訂

実施部署区分

□入院　■外来　□処置

対象疾患

HER2過剰発現乳癌

□進行・再発
■補助療法（術前・術後）
□
□

投与減量の基準

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他 | | | |

投与中止の基準

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他 | LVEFが50%未満に低下した場合または前回比10%の低下 | | |

1クール期間　21日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　18コース

| 薬剤名・略号 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与速度（時間） | 投与日(d1、d8等) |
|---|---|---|---|---|
| ペルツズマブ（パージェタ） | 840mg/body | NS250mL | 60分 | day1（初回） |
| トラスツズマブ | 8mg/kg | NS250mL | 90分 | day1（初回） |
| | | | | |
| 2クール目以降は下記の投与量、投与速度で | | | | |
| ペルツズマブ（パージェタ） | 420mg/body | NS250mL | 30分 | day1（2クール目以降） |
| トラスツズマブ | 6mg/kg | NS250mL | 30分 | day1（2クール目以降） |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1（1クール目）
①生食50mL（ルート確保用）
②パージェタ840mg＋生食250mL（60分）
③生食50mL（60分）
④トラスツズマブ8mg/kg＋生食250mL（90分）
⑤生食50mL（全開）

day1（2クール目以降）
①生食50mL（ルート確保用）
②パージェタ420mg＋生食250mL（30分）
③生食50mL（60分）
④トラスツズマブ8mg/kg＋生食250mL（30分）
⑤生食50mL（全開）