

レジメン名

nab-PTX
---------

出典 JCO 2005;23:7768

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

乳癌
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

ANC	500/mm3未満	PLT	5万/mm3未満
その他	発熱性好中球減少症、G3以上の末梢神経障害 260mg/m2→220mg/m2→180mg/m2		

投与中止の基準

ANC	1500/mm3未満	PLT	10万/mm3未満
その他			

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ナブパクリタキセル(アブラキサン)	260mg/m2	生食適量	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①デキサート6.6mg+生食50mL(15分) ②アブラキサン260mg/m2+生食(30分) インラインフィルターを <b>使用せず</b> に投与 ③生食50mL(全開)