

レジメン名

Trastuzumab emtansine

出典 カドサイラ適正使用ガイド2016年1月改訂

実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

HER2過剰発現乳癌

進行・再発  
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

|          |   |          |            |
|----------|---|----------|------------|
| PLT      | 2.5万/mm <sup>3</sup> 未満                   | T-bil    | 3.6mg/dL以上 |
| AST(GOT) | 200IU/L以上                                 | ALT(GPT) | 200IU/L以上  |
| その他      | 下記のように減量<br>3.6mg/kg→3.0mg/kg→2.4mg/kg→中止 |          |            |

1クール期間 21日  
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

休薬の基準

|          |   |          |             |
|----------|---|----------|-------------|
| PLT      | 5万/mm <sup>3</sup> 未満   | T-bil    | 1.8mg/dL以上※ |
| AST(GOT) | 200IU/L以上※  | ALT(GPT) | 200IU/L以上※  |
| その他      | ※ASTまたはALTが120IU/L以上かつT-bilが2.4mg/dL以上の場合は投与中止<br>LVEFが40%未満に低下または前回比10%以上の低下 |          |             |

| 薬剤名・略号               | 1日投与量    | 投与方法    | 投与速度<br>(時間) | 投与日(d1、d8等) |
|----------------------|----------|---------|--------------|-------------|
| トラスツマブ エムタンシン(カドサイラ) | 3.6mg/kg | NS250mL | 90分※         | day1        |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |
|                      |          |         |              |             |

**1日投与順**

(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation)

day1

- ① 生食50mL(ルート確保用)
- ② カドサイラ+生食250mL(90分※)  
インラインフィルターを用いて投与  
※2回目以降30分まで短縮可
- ③ 生食50mL(フラッシュ用)