

Abemaciclib (術後補助)

实施部署区分

☒入院 ☒外来 ☐処置

ER or/and PgR陽性乳癌

☐ 進行・再発

☒ 補助療法(術前・術後)

☐

☐

総クール数	2年間
-------	-----

①下痢	治療しても症状が継続する又は、減量せずに再開後に再発したGrade2		
	入院を要する又は、Grade3以上		
②肝機能：持続する又は再発のGrade2（右記）、又はGrade3（下記）	AST	120 IU/L以上	
	ALT	135 IU/L以上	
	AST	200 IU/L以上	ALT
③血液毒性：下記			
WBC	2,000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
ANC	1,000/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
④静脈血栓塞栓症：Grade2以上			
⑤その他の副作用：治療しても症状が継続する又は、再発のGrade2で、7日以内にベースライン又はGrade1まで回復しない場合			
⑥その他の副作用：Grade3以上			
その他	①②③(2回目以上)⑥、G-CSFを使用した場合：再開時は1段階減量		
	③(初回)④⑤：再開時には必要に応じて1段階減量		
	1段階減量：200mg/body(1回100mgを1日2回)		
	2段階減量：100mg/body(1回50mgを1日2回)		

WBC	2,000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
ANC	1,000/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
T-bil※	2.4mg/dL以上	AST※	120 IU/L以上
		ALT※	135 IU/L以上

※T-bil・AST・ALTは同時出現若しくは、AST800/ALT900IU/L以上

その他	Grade2以上で24時間以内に回復しない下痢、間質性肺炎、Grade2以上の静脈血検査症、G-CSFを使用した場合 上記以外の副作用：治療しても症状が継続する又は再発の Grade2で、7日以内にベースライン又はGrade1までに回復しない 場合、Grade3以上
-----	--

[illegible]

＜内服＞
ベージニオ 300mg 分2