

レジメン名

bevacizumab＋nab-PTX

出典 J Clin Oncol. 2015 Jul 20;33(21):2361-9

実施部署区分

☐入院 ☒外来 ☐処置

対象疾患

乳癌

☒進行・再発

☐補助療法(術前・術後)

☐

1クール期間

28日

総クール数

PDまで

(次のクールまでの標準期間)

投与減量の基準(アブラキサン:100mg/m²→75mg/m²→50mg/m²)

※前回投与以降に以下の副作用が認められた場合

ANC	d1:1000/mm ³ 未満	PLT	d1:7.5万/mm ³ 未満
その他	・d8、15:ANC1000/mm ³ 未満かつ、PLT10万/mm ³ 未満の場合 ・末梢神経障害:忍容性のないグレード2、グレード3以上		

投与中止の基準(アブラキサン)

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
その他	・末梢神経障害:Grade3以上		

投与中止の基準(ペバシズマブ)

蛋白尿	UPCR2.0以上		
その他	・管理不能な高血圧、可逆性後白質脳症症候群(RPLS)の症状、静脈血栓塞栓症、創傷離開・穿孔、および手術、動脈血栓塞栓症。 ・Grade4以上の副作用		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ペバシズマブ(アバステン)	10mg/kg	NS100mL	90分 (30分まで漸減可能)	day1、15
アブラキサン	100mg/m ²	NS(50)適量mL	30分	day1、8、15

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1、15 ①生食50mL(ルート確保用) ②ペバシズマブ10mg/kg＋生食100mL(90分※) ※2回目は60分、3回目以降は30分まで短縮可 ③生食50mL(全開) ④デキサト6.6mg＋生食100mL(30分) ⑤アブラキサン100mg/m ² ＋生食(50)適量mL(30min)インラインフィルターを用いずに投与 ⑥生食50mL(全開)
day8 ①デキサト6.6mg＋生食100mL(30分) ②アブラキサン100mg/m ² ＋生食(50)適量mL(30min)インラインフィルターを用いずに投与 ③生食50mL(全開)