

レジメン名

dose dense AC

出典

CALGB9741 trial. Citron M.L. et al. JCO. 2003.
GIM2 trial. Del Mastro L, et al. Lancet Oncol. 2022.

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

乳癌

☐進行・再発
☒補助療法(術前・術後)
☐
☐

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	2,000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
ANC	1,500/mm ³ 未満	Hb	9.0g/dL未満
AST/ALT	100 IU/L 以上	Cr	1.5mg/dL以上
その他	LVEFが50%未満に低下または前回比10%以上の低下		

1クール期間 14日

総クール数 4クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ドキソルビシン	60mg/m ²	輸液適量 計100ml	全開	day1
シクロホスファミド(エンドキサン)	600mg/m ²	輸液100mL	30分	day1
ペグフィルグラスチム(ジーラスタ)	3.6mg	皮下		day1(ボディーボット) またはday2、3※
※抗がん剤投与後24時間以内は避ける				

1日投与順
(経時的にプレメタキソン・ポストメタキソン、溶解液まで含む)

<内服>
day1 抗がん剤開始1時間前
①アプレビタント 125mg

<DIV>
①パロセトロン0.75mg/バッグ + テキサート 9.9mg (30分)
②ドキソルビシン60mg/m² + 輸液適量 (全開)
③エンドキサン600mg/m² + 生理食塩液100mL (30分)
④生食50mL (全開)

<皮下>
day2 または day3
①ジーラスタ 3.6mg/body
または
day1
①生食20mL(プライミング用)
②ジーラスタボディーボット3.6mg

<内服>
day2-3
アプレビタント 80mg 分1

day2-4
デカドロン 8mg 分2(省略可)

day1-4
オランザピン5mg 夕食後(糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮するなど慎重に投与)

