

レジメン名

dose-dense PTX

出典

CALGB9741 trial. Citron M.L. et al. JCO. 2003.
GIM2 trial. Del Mastro L, et al. Lancet Oncol. 2022.

実施部署区分

☒ 入院	☒ 外来	☐ 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

乳癌
☐ 進行・再発
☒ 補助療法(術前・術後)
☐
☐

投与減量の基準

その他			

1クール期間

14日

総クール数

4クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	2000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
ANC	1000/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
パクリタキセル	175mg/m ²	輸液500mL	180分	day1
ベグフィルグラスチム(ジーラスタ)	3.6mg	皮下		day1(ボディーボット) またはday2 or 3※
※抗がん剤投与後24時間以内は避ける				

1日投与順
(経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、溶解液まで含む)

day1
①ファモチジン20mg＋デキサート16.5mg＋ホラミン5mg＋生食100mL(30分)

②パクリタキセル175mg/m²＋輸液500mL(180分)
DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与

③生食50mL(全開)

<皮下>
day1
①生食20mL(ブライミング用)
②ジーラスタボディーボット3.6mg/body

または
day2 or 3
①ジーラスタ 3.6mg/body