

レジメン名

Phesgo(Trastuzumab/Pertuzumab皮下注製剤)+DTX

出典

フェスゴ適正使用ガイド
FeDeriCa trial. Lancet Oncol. 2021.

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

乳癌

☐進行・再発

☒補助療法(術前・術後)

☐

☐

投与減量の基準

その他			

1クール期間

21日

総クール数

合計1年間

(次のクールまでの標準期間)

4クール終了後はフェスゴのみを3週ごとに合計1年間投与

投与中止の基準

WBC	2,000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
ANC	1,500/mm ³ 未満	Hb	8.0g/dL未満
AST	120IU/L以上	ALT	135IU/L以上
その他	LVEFが50%未満に低下した場合または前回比10%の低下		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
(1)1クール目				
フェスゴ配合皮下注IN	15ml	皮下注	8分以上	day1(初回)
ドセタキセル	75mg/m ²	輸液250mL	60分	day1(初回)
(2)2,3,4クール目は下記の投与量、投与速度で				
フェスゴ配合皮下注MA	10ml	皮下注	5分以上	day1(2回目以降)
ドセタキセル	75mg/m ²	輸液250mL	60分	day1(2回目以降)
(3)4クール終了後はフェスゴのみを3週ごとに下記の投与量で、(1)(2)合わせて計1年間実施				
フェスゴ配合皮下注MA	10ml	皮下注	5分以上	day1

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、溶解液まで含む)

(1) day1(初回)
①フェスゴ配合皮下注IN 15ml (8分以上かけて大腿部に皮下投与)
②生食50mL(ルート確保用)(30分経過観察)
③デキサート6.6mg+生食100mL(30分)
④ドセタキセル75mg/m²+輸液250mL (60分)
⑤生食50mL(全開)
day2-3
①デカロン 4mg 分1

(2) day1(2,3,4クール)
①フェスゴ配合皮下注 10ml (5分以上かけて大腿部に皮下投与)
②生食50mL(ルート確保用)(15分経過観察)
③デキサート6.6mg+生食100mL(30分)
④ドセタキセル75mg/m²+輸液250mL (60分)
⑤生食50mL(全開)
day2-3
①デカロン 4mg 分1

(3) day1(4クール終了後)
①フェスゴ配合皮下注 10ml (5分以上かけて大腿部に皮下投与、投与後15分経過観察)