

レジメン名

Talazoparib

出典

ターゼナ適正使用ガイド
EMBRACA試験(NEJM 2018)

実施部署区分

☒入院

☒外来

☐処置

対象疾患

乳癌

■進行・再発 BRCA病的バリエント保持者

☐補助療法(術前・術後)

☐

☐

投与減量の基準

ANC	1,000/mm ³ 未満	PLT	初回:5万/mm ³ 未満
Hb	8.0g/dL未満		
その他	Grade3以上の副作用		

下記のように減量
1mg(1mg 1cap)→1段階減量:0.75mg(0.25mg 3cap)→2段階減量:0.5mg(0.25mg 2cap)→3段階減量:0.25mg(0.25mg 1cap)→投与中止

1クール期間

連日

総クール数

PDまで

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1,000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
		Hb	8.0g/dL未満
その他	上記以外のGrade 3または4については、Grade1以下に回復するまで休薬 腎機能障害患者(eGFR 30未満)は原則使用不可		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
タラゾパリブ(ターゼナ)	1mg [※] /day 分1	経口		連日
※eGFR30mL/min/1.73m ² 以上、60mL/min/1.73m ² 未満では、0.75mgを開始用量とする。				

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

ターゼナ 1mg[※] 1cap を1日1回内服