

レジメン名

weekly Trastuzumab+PTX(Adj)

出典

N Engl J Med 2015;372:134-141.
タキソール使用ガイド 2012年9月作成
ハーセプチン適正使用ガイド2011年11月改訂

実施部署区分

☒入院 ☒外来 ☐処置

対象疾患

HER2過剰発現乳癌

☐進行・再発

☒補助療法(術前・術後)

☐

☐

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

WBC	3000/mm3未満	Plt	7.5万/mm3未満
ANC	1500/mm3未満	Hb	10.0g/dL未満
その他	LVEFが50%未満に低下または前回比10%以上の低下		

1クール期間 7日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数 12クール*

※12クール終了後はトラスツマブのみを3週ごとに14回投与

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
トラスツマブ	4mg/kg	NS250mL	90分	day1 (初回)
トラスツマブ	2mg/kg	NS250mL	30分	day1 (2回目以降)
パクリタキセル	80mg/m ²	輸液250mL	60分	day1
12クール終了後はトラスツマブのみを3週ごとに下記の投与量で14回実施				
トラスツマブ	6mg/kg	NS250mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation ン、溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用) ②トラスツマブ+注射用水適量 (21mg/mL)mL+生食250mL(90分※) ※2回目以降は30分まで短縮可 ③生食50mL(全開) ④ファモチジン20mg+デキサート6.6mg+ホウラミン5mg+ 生食100mL(30分) ⑤パクリタキセル80mg/m ² +輸液250mL(60分) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与 ⑥生食50mL(全開)
12クール終了後 day1 ①生食50mL(ルート確保用) ②トラスツマブ6mg/kg++注射用水適量 (21mg/mL)mL生食250mL(30分) ③生食50mL(全開)