

レジメン名

weekly PTX(患者限定レジメン)

出典 Int J Clin Oncol.2008Feb;13(1):62-5

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

子宮頸がん

進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他	最低用量:80mg/m ²

1クール期間

28日

総クール数

PDまで

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満*
ANC	1500/mm ³ 未満	T-bil	2.4mg/dLを超える
AST(GOT)	100IU/L以上	ALT(GPT)	100IU/L以上
その他	Hb 8g/dL未満 Grade2以上の非血液毒性		

※出典ではPit 10万/mm³、制限が厳しいため上記の値で登録

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
パクリタキセル	80mg/m ²	NS250mL	60分	d1、8、15、(22)

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1、8、15、22
 ①ファモチジン20mg+デキサート6.6mg+ボラミン5mg+生食100(30min)
 ②パクリタキセル80mg/m²+生食250mL(60min)
DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与
 ③生食50mL(フラッシュ用)