

レジメン名

CCRT (weekly CDDP)

出典 子宮頸がんガイドライン2022
N Engl J Med 340(15):1144-53(1999)

実施部署区分

☒入院 ☐外来 ☐処置

対象疾患

子宮頸がん

☒進行・再発
☒補助療法(術前・術後)
☐初発

投与減量の基準

CCr	30mL/min以上45mL/min以下	CDDP:50%減量
	45mL/minを超えるかつ80mL/min以下	CDDP:25%減量
その他	下記の場合、CDDP 30mg/m ² →中止 悪心・嘔吐:Grade4 神経毒性:Grade2以上	

1クール期間 7日
(次のクールまでの標準期間)総クール数 5~6
コース

投与中止の基準

CCr	30mL/min未満		
その他	Grade3以上の神経毒性		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
【化学放射線療法】				
シスプラチン	40mg/m ²	生食計500mL	60分	d1
放射線照射	1.8~2Gy/日	合計45~50.4Gy		d1- 週5回

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
<内服> day1-3 アブレヒタントカプセル(125-80-80) day1は化学療法開始1時間前、day2,3は朝食後 day1-4 オランザピン5mg 夕食後 (糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮す るなど慎重に投与)
<DIV> day1 ①ソルデム1 500mL/120min ②ソルデム3A 500mL+硫酸マグネシウム 20mL/120min ③パロノセトロン点滴静注ハック0.75mg+デキ サート9.9mg/15min ④マンニット(500)250mL/30min ⑤シスプラチン40mg/m ² +生食 計500mL/60min ⑥ソルデム1 500mL/60min ⑦ソルデム1 500mL/60min ⑧ソルデム1 500mL/60min ⑨ソルデム3A 500mL/60min day2-3 ①デキサート6.6mg+NS 50mL/15min ②ソルデム1 500mL/120min ③ソルデム1 500mL/120min ④ソルデム3A 500mL/120min day4 ①デキサート6.6mg+NS 50mL/15min