

レジメン名

FCR

出典 Lancet 2010;376:1164-74  
リツキサン添付文書2021年9月改訂

## 実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

 慢性リンパ性白血病  
進行・再発  
補助療法(術前・術後)  
  


## 投与減量の基準

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
| その他 | Cr<math>30\text{mL}/\text{min}</math>以上、70mL/min未満(減量の目安)<br>Cr<math>30\text{mL}/\text{min}</math>:フルダラビン18mg/m <sup>2</sup><br>Cr<math>50\text{mL}/\text{min}</math>:フルダラビン14mg/m <sup>2</sup><br>Cr<math>70\text{mL}/\text{min}</math>:フルダラビン12mg/m <sup>2</sup> |  |  |

## 投与中止の基準

|     |   |     |                          |
|-----|---|-----|--------------------------|
| WBC | 1000/mm <sup>3</sup> 未満*  | PLT | 2.5万/mm <sup>3</sup> 未満* |
| Hb  | 8.5g/dL未満*  |     |                          |
| その他 | Cr<math>30\text{mL}/\text{min}</math>未満<br>※出典に中止基準が無い場合、Grade4の血液毒性を中止基準とした。 |     |                          |

1クール期間 28日

総クール数 6クール

(次のクールまでの標準期間)

| 薬剤名・略号   | 1日投与量                | 投与方法                       | 投与速度(時間)                | 投与日(d1、d8等)      |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| リツキシマブ(リツキサン)  | 375mg/m <sup>2</sup> | 輸液<br>1-4mg/mLに希釈          | 初回は<br>50mg/hr<br>から漸増* | d1(1クール目)        |
| リツキシマブ(リツキサン)  | 500mg/m <sup>2</sup> | 輸液<br>1-4mg/mLに希釈          | 100mg/hr<br>から漸増*       | d1(2-6クール目)      |
| フルダラビン(フルダラ)   | 25mg/m <sup>2</sup>  | AQ2.5mL/Vで溶解<br>NS100mLに希釈 | 30分                     | d1-3(1クール目はd2-4) |
| シクロホスファミド(エンドキサン)  | 250mg/m <sup>2</sup> | NS250-<br>500mL            | 2時間                     | d1-3(1クール目はd2-4) |
| ※1 初回リツキシマブの投与速度は50mg/hrで開始し、問題なければ30分毎に50mg/hrずつ上げて、400mg/hrまで上げることができる。<br>初回投与時に副作用が軽微であった場合、2回目以降は100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて、400mg/hrまで上げることができる。 |                      |                            |                         |                  |
|  |                      |                            |                         |                  |
|  |                      |                            |                         |                  |
|  |                      |                            |                         |                  |
|  |                      |                            |                         |                  |
|  |                      |                            |                         |                  |

| 1日投与順<br>(経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、<br>溶解液まで含む)  |
|--|
| <1クール目><br>day1<br>①ヒトロコルチン/コルヒン酸Na200mg+ホラミン5mg+生食50mL(30min)<br>②リツキサン375mg/m <sup>2</sup> +生食適量(50mg/hrから漸増*)<br>③生食50mL(フラッシュ用)<br>day2<br>①アロキシ0.75mg/バッグ+デキサート9.9mg(15-30min)<br>②フルダラ25mg/m <sup>2</sup> +注射用水20mg/mL(溶解2.5mL/V)+生食100mL(30min)<br>③エンドキサン250mg/m <sup>2</sup> +生食250-500mL(2hr)<br>④生食50mL(フラッシュ用)<br>day3-4<br>①デキサート6.6mg+生食100mL(15-30min)<br>②フルダラ25mg/m <sup>2</sup> +注射用水20mg/mL(溶解2.5mL/V)+生食100mL(30min)<br>③エンドキサン250mg/m <sup>2</sup> +生食250-500mL(2hr)<br>④生食50mL(フラッシュ用) |
| <2-6クール目><br>day1<br>①ヒトロコルチン/コルヒン酸Na200mg+ホラミン5mg+生食50mL(30min)<br>②リツキサン500mg/m <sup>2</sup> +生食適量(100mg/hrから漸増*)<br>③生食50mL(フラッシュ用)<br>④アロキシ0.75mg/バッグ+デキサート9.9mg(15-30min)<br>⑤フルダラ25mg/m <sup>2</sup> +注射用水20mg/mL(溶解2.5mL/V)+生食100mL(30min)<br>⑥エンドキサン250mg/m <sup>2</sup> +生食250-500mL(2hr)<br>⑦生食50mL(フラッシュ用)  |
| day2-3<br>①デキサート6.6mg+生食100mL(15-30min)<br>②フルダラ25mg/m <sup>2</sup> +注射用水20mg/mL(溶解2.5mL/V)+生食100mL(30min)<br>③エンドキサン250mg/m <sup>2</sup> +生食250-500mL(2hr)<br>④生食50mL(フラッシュ用)   |