レジメン名

bendamustine

出典　トレアキシン適正使用ガイド2018年7月作成

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

慢性リンパ性白血病

■進行・再発
□補助療法（術前・術後）
□
□

投与減量の基準

| ANC | 500/mm$^3$未満 | PLT | 2.5万/mm$^3$未満 |
|---|---|---|---|
| 非血液毒性 | Grade3以上 | | |
| | | | |
| その他 | 前コース投与中に上記のいずれかの副作用を認めた場合、トレアキシンを100mg/m$^2$→75mg/m$^2$→50mg/m$^2$→中止の順に減量を検討。 | | |

投与中止の基準

| ANC | 1000/mm$^3$未満 | PLT | 7.5万/mm$^3$未満 |
|---|---|---|---|
| Cr | 2.0mg/dL以上 | T-bil | 2.0mg/dL以上 |
| 非血液毒性 | Grade3以上 | | |
| その他 | | | |

1クール期間　28日
（次のクールまでの標準期間）

総クール数　6クール

| 薬剤名・略号 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与速度（時間） | 投与日(d1、d8等) |
|---|---|---|---|---|
| ベンダムスチン（トレアキシン） | 100mg/m$^2$ | NS250mL | 60分 | d1、2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1日投与順
（経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）

day1、2
①グラニセトロン3mgバッグ（15-30min）
②トレアキシン100mg/m$^2$＋NS250mL（60min）
③生食50mL（フラッシュ用）