

レジメン名

CDDP+VP-16+胸部加速過分割照射療法

出典 J Clin Oncol 20:3054-3060

実施部署区分

☒ 入院
☐ 外来
☐ 処置

対象疾患

限局型小細胞肺癌

☒ Stage I 以外

☐
☐
☐

投与減量の基準

WBC	1,000/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満
ANC	500/mm ³ 未満	上記の場合、エトポシドを75%doseへ減量。	
CLor	60mL/min未満	上記の場合、シスプラチンを50%doseへ減量。	
その他			

投与中止の基準

WBC	3,000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
T-Bil	2.0mg/dL以上	AST/ALT	100IU/Lを超える
CR	2.0mg/dL以上		
その他			

1クール期間 21-28日※

総クール数 4クール

(次のクールまでの標準期間)

※放射線照射中は4週ごと

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
エトポシド	80-100mg/m ² ※	輸液500mL	120分	d1-3
シスプラチン	80mg/m ²	生食適量 計500mL	120分	d1
胸部加速過分割照射	1.5Gy/回 1日2回	合計45Gy/30回		d1- 週5回×3週間
※出典ではエトポシドの投与量は100mg/m ² だが、医師と協議し80-100mg/m ² で登録とした。				

1日投与順
 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1

- ①ハロ/セロン0.75mg/kg+デキサート9.9mg(15-30min)
- ②エトポシド80-100mg/m²※+輸液500mL(2hr)
DEHPフリーの点滴セットを用いて投与
- ③硫酸マグネシウム4mL+ソルテム3A500mL(60min)
- ④マンニトール250mL(30min)
- ⑤シスプラチン80mg/m²+生食適量計500mL(2hr)
- ⑥硫酸マグネシウム4mL+ソルテム3A500mL(60min)

day2-3

- ①**デキサート6.6mg**+生食50mL(15-30min)
- ②エトポシド80-100mg/m²※+輸液500mL(2hr)
DEHPフリーの点滴セットを用いて投与
- ③生食50mL(フラッシュ用)

day4

- ①**デキサート6.6mg**+生食50mL(15-30min)

<内服>

day1-3

アブレタントカプセル(125-80-80)

day1はベムレキセドの1時間前、day2,3は朝食後

day1-4

オランザピン5mg 夕食後

(糖尿病は禁忌、高齢者は2.5mgへ減量を考慮するなど慎重に投与)