

レジメン名

Cemiplimab

出典      リブタヨ適正使用ガイド 2025年3月作成

実施部署区分

☒入院

☐外来

☐処置

対象疾患

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

☒進行・再発

☐補助療法（術前・術後）

☐

☐

投与減量の基準

|     |                                                           |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                           |  |  |
|     |                                                           |  |  |
| その他 | Grade1又は2のInfusion reaction出現時：本剤の投与を中断、もしくは投与速度を50%減速する。 |  |  |

1クール期間

21日

総クール数

PDまで

（次のクールまでの標準期間）

投与中止の基準

|       |                                                                                                                                                                 |     |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| AST   | 120IU/L以上                                                                                                                                                       | ALT | 135IU/L以上 |
| T-bil | 1.8mg/dL以上                                                                                                                                                      |     |           |
| Cr    | 男性1.08、女性0.80mg/dLを超える又はベースライン値の1.5倍超                                                                                                                           |     |           |
| その他   | ・Grade2以上：間質性肺疾患、大腸炎・下痢、副腎機能不全、下垂体炎、1週間以上続く皮膚障害<br>・Grade3以上：甲状腺機能低下症・亢進症・甲状腺炎、1型糖尿病、皮膚障害<br>・SJS・TENの疑い、発症<br>・Grade3以上のInfusion reaction<br>上記以外のGrade2以上の副作用 |     |           |

| 薬剤名・略号       | 1日投与量      | 投与方法    | 投与速度（時間） | 投与日(d1、d8等) |
|--------------|------------|---------|----------|-------------|
| セミプリマブ（リブタヨ） | 350mg/body | 輸液100mL | 30分      | day1        |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |
|              |            |         |          |             |

1日投与順  
（経時的にプレメディケーション・ポストメディケーション、溶解液まで含む）

day1

①生食50mL（ルート確保用）

②リブタヨ350mg＋輸液100mL（30分）  
0.2～5μmのインラインフィルターを使用

③生食50mL（フラッシュ用）