

レジメン名

CHOP

出典 J Clin Oncol 22:4711-4716.
J Clin oncol 23:4117-4126.

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

CD20陰性NHL
<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

1クール期間 21日

総クール数 6-8クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	500/mm ³ 未満*	PLT	5万/mm ³ 未満*
		Hb	6.5g/dL未満*
その他	*出典ではANC 1500/mm ³ 未満、Plt 10万/mm ³ 未満、Hb 8.0g/dL未満だが、制限が厳しいため上記の値で登録		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ドキシソルピシン	50mg/m ²	輸液適量 計100mL	15-60分	d1
ビンクリスチン(オンコビン)	1.4mg/m ² (上限2mg)	輸液100mL	15-60分	d1
シクロホスファミド(エンドキサン)	750mg/m ²	輸液500mL	2-3時間	d1
プレドニゾン	100mg/day	経口or点滴	15-30分	d1-5

1日投与順 (経時的にプレドニゾン・ポストプレドニゾン、 溶解液まで含む)
day1 プレドニン100mg内服* ①グラニセトロン3mgバッグ(±プレドニン100mg ※)(15-30min) ②ドキシソルピシン50mg/m ² +輸液適量(15- 60min) ③オンコビン1.4mg/m ² +輸液100mL(15-60min) ④エンドキサン750mg/m ² +輸液500mL(2-3hr) ⑤生食50mL(フラッシュ用) ※プレドニンは経口か注射のいずれか一方 のみ投与 day2-5 ①プレドニン100mg内服