

レジメン名

DeVIC

出典 J Clin Oncol 27:5594-5600

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

投与減量の基準

その他			

NK/T細胞リンパ腫
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与中止の基準

WBC	3000/mm ³ 未満	ANC	1200/mm ³ 未満
Plt	10万/mm ³ 未満	AST,ALT	200IU/L以上
T-bil	2.0mg/dL以上		
その他			

1クール期間 21日

総クール数 6クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
デキサメタゾン	33mg/body		15-30分	d1-3
エトポシド	100mg/m ²	輸液500mL	3時間	d1-3
イホスファミド(イホマイド)	1500mg/m ²	NS500mL	3時間	d1-3
カルボプラチン	300mg/m ²	5%TZ250mL	1時間	d1
メスナ(ウロミテキサン)	300mg/m ² /回 1日3回	輸液100mL	15-30分	d1-3

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①グラニセロン3mg/kg + デキサート33mg (15-30min) ②エトポシド100mg/m ² + 輸液500mL (3hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③イホマイド1500mg/m ² + 生食500mL (3hr) ④(側管)ウロミテキサン300mg/m ² (イホマイド投与時、4時間後、8時間後の3回、15-30分で点滴) ⑤カルボプラチン300mg/m ² + 5%糖液250mL (1hr) ⑥生食50mL (フラッシュ用)
day2-3 ①グラニセロン3mg/kg + デキサート33mg (15-30min) ②エトポシド100mg/m ² + 輸液500mL (3hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③イホマイド1500mg/m ² + 生食500mL (3hr) ④ウロミテキサン300mg/m ² (イホマイド投与時、4時間後、8時間後の3回、15-30分で点滴) ⑤生食50mL (フラッシュ用)