

レジメン名

CMD

出典 Cancer Sci 2006;97:933-937
Cancer Sci 2007;98:109-112

実施部署区分

<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

非ホジキンリンパ腫*
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/> 基本は3rd line以降 * 出典ではDLBCL、末梢性T細胞性リンパ腫であったが、医師と協議しNHLで登録

投与減量の基準

その他	ドキシソルピシン総投与量300mg/m ² 以下		

1クール期間 21日

総クール数 6クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満*	PLT	7.5万/mm ³ 未満
Cr	1.6mg/dL以上	T-bil	2.4mg/dL以上
AST,ALT	200IU/L以上		
その他	※出典ではANC 1500/mm ³ 未満だが、制限が厳しいため上記の値で登録		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
irinotecan	25mg/m ²	NS250mL	1時間	d1-2
mitoxantrone	8mg/m ²	NS100mL	30分	d3
dexamethasone	33mg/body		30分	d1-3

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1、2 ① グラニセトロン3mgバッグ+デキサート33mg(30min) ② irinotecan 25mg/m ² +生食250mL(1hr) ③ 生食50mL(フラッシュ用)
day3 ① グラニセトロン3mgバッグ+デキサート33mg(30min) ② ノバントロン8mg/m ² +生食100mL(30min) ③ 生食50mL(フラッシュ用)