

レジメン名

|      |
|------|
| ABVD |
|------|

出典

N Eng J Med 1992;327:1478  
 J Clin oncol 2003;21:607  
 J.Pharmaceut. Bio.Anal., 10:675-683(1992)<sup>※3</sup>

実施部署区分

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 入院 | <input type="checkbox"/> 外来 | <input type="checkbox"/> 処置 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

対象疾患

|  |
|--|
| ホジキンリンパ腫(進行期)                          |
| <input type="checkbox"/> 進行・再発         |
| <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 初発 |
| <input type="checkbox"/>               |

投与減量の基準

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

1クール期間

28日

総クール数

6-8クール

(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

|     |                         |     |                         |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| WBC | 3000/mm <sup>3</sup> 未満 | ANC | 1000/mm <sup>3</sup> 未満 |
| PLT | 5万/mm <sup>3</sup> 未満   |     |                         |
| その他 |                         |     |                         |

| 薬剤名・略号  | 1日投与量                           | 投与方法                                    | 投与速度(時間) | 投与日(d1、d8等) |
|---|---------------------------------|---|----------|-------------|
| ダカルバジン  | 375mg/m <sup>2</sup>            | AQ10mL/Vで溶解<br>輸液100mLに希釈 <sup>※2</sup> | 30分      | d1、15       |
| ドキシソルピシン  | 25mg/m <sup>2</sup>             | 輸液適量<br>計100mL                          | 30分      | d1、15       |
| プレオマイシン(プレオ)  | 10mg/m <sup>2</sup><br>(上限15mg) | 輸液100mL                                 | 30分      | d1、15       |
| ピンブラスチン(エクザール)  | 6mg/m <sup>2</sup><br>(上限10mg)  | 輸液100mL                                 | 30分      | d1、15       |
|   |                                 |   |          |             |
| ※2 添付文書上、溶解液量の指定なし。出典 <sup>※3</sup> の報告では、溶解濃度が低いほど、経時的に発痛物質が生成するとのデータがある。メーカーDIに確認し、30分投与、生食100mLの投与例ありと。以上を踏まえ、田所Drと協議の結果、30分、生食100mL投与・投与順を1番目に変更とした。2022.4.21 |                                 |   |          |             |
|   |                                 |   |          |             |
|   |                                 |   |          |             |

| 1日投与順<br>(経時的にプレマイケーション・ポストマイケーション、溶解液まで含む)  |
|--|
| day1、15<br>①アロキシシ0.75mg/バッグ+デキサート13.2mg(15-30min)<br>②ダカルバジン375mg/m <sup>2</sup> +注射用水10mL/V+輸液100mL(30min) <sup>※1</sup><br>※1 点滴経路全般を遮光<br>③ドキシソルピシン25mg/m <sup>2</sup> +輸液適量(30min)<br>④プレオ10mg/m <sup>2</sup> +輸液100mL(30min)<br>⑤エクザール6mg/m <sup>2</sup> +輸液100mL(30min)<br>⑥生食50mL(フラッシュ用) |