

レジメン名

EPOCH

出典 J Clin Oncol 11:1573-1582.
J Clin Oncol 18:3633-3642.

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	-----------------------------	-----------------------------

対象疾患

非ホジキンリンパ腫
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他	day1のANCが1000-1500/mm ³ のとき、あるいは nadirのANCが500/mm ³ 未満のとき、シクロホスファミドを75%doseへ減量。
-----	---

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Gr	1.5mg/dL以上	CLcr	40mL/min以下
		T-bil	2.5mg/dL以上
その他			

1クール期間 21日間

総クール数 6-8クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
エトポシド	50mg/m ²	輸液500mL	24時間	d1-4
ピンクリスチン(オンコビン)	0.4mg/m ²	輸液500mL	24時間	d1-4
ドキシソルビシン	10mg/m ²		24時間	d1-4
シクロホスファミド(エンドキサン)	750mg/m ²	輸液500mL	3時間	d5
プレドニゾン	60mg/m ²	経口or点滴	15-30分	d1-5

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 プレドニン60mg/m ² 内服※ ①グラニセトロン3mgバッグ(±プレドニン60mg/m ² ※)(15-30min) ②エトポシド50mg/m ² +生食500mL(24hr) ①'(側管)生食50mL(day1のみ ルート確保用) ②'(側管)オンコビン0.4mg/m ² +ドキシソルビシン10mg/m ² +輸液500mL(24hr)
day2-4 プレドニン60mg/m ² 内服※ ①エトポシド50mg/m ² +生食500mL(24hr) ①'(側管1)オンコビン0.4mg/m ² +ドキシソルビシン10mg/m ² +輸液500mL(24hr) ①''(側管2)グラニセトロン3mgバッグ(±プレドニン60mg/m ² ※)(15-30min)
day5 プレドニン60mg/m ² 内服※ ①'(側管1)生食50mL(ルートフラッシュ用) ①グラニセトロン3mgバッグ(±プレドニン60mg/m ² ※)(15-30min) ②エンドキサン750mg/m ² +輸液500mL(3hr) ③生食50mL(フラッシュ用)
※プレドニンは経口か注射のいずれか一方のみ投与