

レジメン名 hyperCVAD

出典 J Clin Oncol 18:547-561.  
J Clin oncol 23:7013-7023.  
Cancer 2006;106:1569-80.

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

ALL、マントルリンパ腫、パーキットリンパ腫  
進行・再発  
補助療法(術前・術後)  
初発

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満	PLT	10万/mm <sup>3</sup> 未満
T-bil	1.5mg/dL以上	Cr	2mg/dL以上
その他			

1クール期間 21日

総クール数 1,3,5,7クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
シクロホスファミド(エンドキサン)	300mg/m <sup>2</sup> /回を2回/日	輸液500mL	3時間	d1-3
ドキシルピシン	25mg/m <sup>2</sup>	輸液適量 計100mL	30分	d4-5
ピンクリスチン(オンコビン)	2mg/body	輸液100mL	30分	d4、11
デキサメサゾン	33mg/body	輸液100mL	30分	d1-4、11-14

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-3 ①グラニセロン3mg/バッグ+デキサート33mg (30min) ②エンドキサン300mg/m <sup>2</sup> +輸液500mL (3hr) ③生食50mL(フラッシュ用) ④グラニセロン3mg/バッグ (30min) ⑤エンドキサン300mg/m <sup>2</sup> +輸液500mL (3hr) ⑥生食50mL(フラッシュ用)
day4 ①グラニセロン3mg/バッグ+デキサート33mg (30min) ②ドキシルピシン25mg/m <sup>2</sup> +輸液適量 (30min) ③オンコビン2mg/body+輸液100mL (30min) ④生食50mL(フラッシュ用)
day5 ①グラニセロン3mg/バッグ+デキサート33mg (30min) ②ドキシルピシン25mg/m <sup>2</sup> +輸液適量 (30min) ③生食50mL(フラッシュ用)
day11 ①デキサート33mg+輸液100mL (30min) ②オンコビン2mg/body+輸液100mL (30min) ③生食50mL(フラッシュ用)
day12-14 ①デカドロン33mg+輸液100mL (30min)