

レジメン名 mESHAP

出典 Journal of Chemotherapy vol.22(54-57)

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患

非ホジキンリンパ腫

進行・再発  
補助療法(術前・術後)  
初発

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満		
その他			

1クール期間 21-28日\*

総クール数 6クール

(次のクールまでの標準期間)  
 \* 出典では28日だが、ESHAPに準じて21-28日で登録。

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
エトポシド	40mg/m <sup>2</sup> *	輸液250mL ~500mL	2-3時間	d1-4
カルボプラチン	AUC1.25 × (GFR+25)	5%TZ1000mL	24時間	d1-4
シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup> *	輸液500mL	2-3時間	d5
メチルプレドニゾン	500mg/body		15-60分	d1-5
※元文献では60mg/m <sup>2</sup> だが、ESHAPに準じて40mg/m <sup>2</sup> で登録。				
* 65歳以上では1000mg/m <sup>2</sup> に減量。				

1日投与順 (経時的にプレメドレーション・ポストメドレーション、 溶解液まで含む)
day1-4 ①生食50mL(day1のみ ルート確保用) ②カルボプラチン+5%糖液500mL(24hr) (エトポシドとは別ルートで) <側管> ①'グラニセトロン3mg/バッグ+ソル・メルコート500mg(15-60min) ②エトポシド40mg/m <sup>2</sup> *+輸液250mL(2-3hr) DEHPフリーの点滴セットを用いて投与 ③生食50mL(ルート確保用)
day5 ①グラニセトロン3mg/バッグ+ソル・メルコート500mg(15-60min) ②シタラビン2000mg/m <sup>2</sup> *+輸液500mL(2-3hr) ③生食50mL(フラッシュ用)