

レジメン名 escalated BEACOPP

出典 J Clin Oncol 2016; 34:2020-2027

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患 ホジキンリンパ腫
進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

その他			

1クール期間 21日 総クール数 6-8コース
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	※500/mm ³ 未満	PLT	※2.5万/mm ³ 未満
		Hb	※6.5g/dL未満
その他	※出典に中止基準ないためGrade4の血液毒性で設定		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ドキシルピシン	35mg/m ²	輸液適量 計100mL	30分	d1
エトポシド	200mg/m ²	輸液500mL	2時間	d1-3
シクロホスファミド(エンドキサン)	1250mg/m ²	輸液500mL	2時間	d1
プレオマイシン(プレオ)	10mg/m ²	輸液100mL	30分	d8
ピンクリスチン(オンコビン)	1.4mg/m ² (上限2mg)	輸液100mL	30分	d8
プレドニゾロン	40mg/m ²	経口		d1-14
塩酸プロカルバジン	100mg/m ²	経口		d1-7

1日投与順 (経時的にプレメディケーション・ホストメディケーション、 溶解液まで含む)
day1 ①グラニセトロン3mg/バッグ(15-30min) ②ドキシルピシン35/m ² +輸液適量(30min) ③エンドキサン1250mg/m ² +輸液500mL(2hr) ④エトポシド200mg/m ² +輸液500mL(2hr) ⑤生食50mL(フラッシュ用) day2-3 ①生食50mL(ルート確保用) ②エトポシド200mg/m ² +輸液500mL(2hr) ③生食50mL(フラッシュ用) day8 ①生食50mL(ルート確保用) ②プレオ10mg/m ² +輸液100mL(30min) ③オンコビン1.4mg/m ² +輸液100mL(30min) ④生食50mL(フラッシュ用) day1-14 ①プレドニン40mg/m ² 内服 day1-7 ①塩酸プロカルバジン100mg/m ² 内服