

レジメン名 GDP

出典 cancer 2004;101:1835-1842

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患
B細胞性非ホジキンリンパ腫
進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

その他			

1クール期間 21日 総クール数 6クール
(次のクールまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
AST(GOT)	100IU/L以上	ALT(GPT)	100IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上	Cr	1.5mg/dL以上
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%糖液100mL	30分	day1, 8
シスプラチン	75mg/m ²	生食適量計500mL	2時間	day1
デカドロン	40mg/body	経口		day1-4

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 アプレピタント125mg 内服 ①輸液1000mL ②グラニセトロン3mgバッグ(15分) ③(側管)硫酸マグネシウム20mL+ソルテム 3A200mL(30分) ④(側管)ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液 100mL(30分) ⑤(側管)マンニット250mL(30分) ⑥(側管)シスプラチン75mg/m ² +生食適量計 500mL(2時間) ⑦(側管)マンニット250mL(30分) ⑧輸液500mL+フロセド20mg(1.5時間) ⑨輸液500mL(1.5時間)
day8 ①グラニセトロン3mgバッグ(30分) ②ゲムシタビン1000mg/m ² +5%糖液100mL (30分) ③生食50mL(フラッシュ用)
day1-4 デカドロン40mg内服 day2-3 アプレピタント80mg 内服