レジメン名

Forodesine

出典　ムンデシン適正使用ガイド2017年5月作成

実施部署区分

■入院　■外来　□処置

対象疾患

末梢性T細胞リンパ腫

■進行・再発
□補助療法（術前・術後）
□初発
□

投与減量の基準

ANC	500/mm^{3}未満	PLT	2.5万/mm^{3}未満
Ccr	50mL/min未満		
その他	Grade3以上の非血液毒性 →回復するまで休薬し、再開時は減量を考慮 ※減量後に再度増量はしないこと		

1クール期間

（次のクールまでの標準期間）

総クール数　PDまで

投与中止の基準

ANC	500/mm^{3}未満	PLT	2.5万/mm^{3}未満
その他	Grade3以上の非血液毒性 ※減量し投与再開後に上記（ANC,PLT,非血液毒性）副作用が発現した場合には本剤の投与を中止		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度（時間）	投与日(d1、d8等)
フォロデシン（ムンデシン）	600mg/body	経口		連日

1日投与順 （経時的にﾌﾟﾚﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ、溶解液まで含む）
ムンデシンは分2で内服