

レジメン名

Romidepsin

出典 イストダックス適正使用ガイド2018年4月改訂
Int J Hematol (2017)106:655-665

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

末梢性T細胞リンパ腫

進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

Pit	2.5万/mm ³ 未満*
ANC	500/mm ³ 未満かつ38.5°C以上の発熱*
QTc間隔	500msを超える
その他	※Pit:5万/mm ³ 未満に再び減少時も減量 *ANC: 1000/mm ³ 未満に再び減少時も減量 非血液毒性: Grade3の再発、Grade4 不整脈の発現 T-bil>1.8mg/dL(3.6mg/dL以下): 7mg/m ² T-bil>3.6mg/dL: 5mg/m ²

投与中止の基準

Pit	5万/mm ³ 未満	ANC	1000/mm ³ 未満
QTc間隔	500msを超える		
その他	非血液毒性: Grade3 不整脈の発現		

1クール期間 28日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ロミデプシン(イストダックス)	14mg/m ²	NS500mL	4時間	d1、8、15

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

day1,8,15
①グラニセトロン3mg/バッグ(15-30min)
②イストダックス14mg/m²+生食500mL(4hr)
③生食50mL(フラッシュ用)