

レジメン名

Bortezomib (皮下注)

出典 **ベルケイド適正使用ガイドハンドブック
(第4.0版)2022年8月作成**

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

リンパ形質細胞リンパ腫、原発性マクログロブリン血症

進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準(1.3mg/m²→1.0mg/m²→0.7mg/m²→投与中止)

ANC	500/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満
Hb	Grade4	AST,ALT	800,900IU/L超
T-bil	12mg/dL超		
その他	Grade3以上の非血液毒性(末梢性ニューロパチーや神経因性疼痛を除く) Grade4の血液毒性疼痛を伴うGrade1またはGrade2の末梢性ニューロパチーまたは神経障害性疼痛		

1クール期間 21日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 PDまで

投与中止の基準

ANC	500/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満
Hb	Grade4	AST,ALT	800,900IU/L超
T-bil	12mg/dL超		
その他	Grade3以上の非血液毒性(末梢性ニューロパチーや神経因性疼痛を除く) Grade4の血液毒性疼痛を伴うGrade2またはGrade3の末梢性ニューロパチーまたは神経障害性疼痛(症状が回復した場合は0.7mg/m ² 週1回投与に減量)		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	生食適量	皮下注射	d1、4、8、11

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
溶解液まで含む)

day1、4、8、11
 ①ボルテゾミブ1.3mg/m²+生食適量(皮下注射)