

レジメン名

A+AVD

出典 アドセトリス適正使用ガイド

実施部署区分

入院    外来    処置

対象疾患

未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫  
 進行・再発  
 補助療法(術前・術後)  
 初発

投与減量の基準

その他	Grade2の末梢神経障害において、回復後0.9mg/kgに減量して投与継続する Grade3の末梢神経障害において、回復後0.9mg/kgに減量して投与再開する		

投与中止の基準

ANC	1000/mm <sup>3</sup> 未満		
その他	Grade3の末梢神経障害		

1クール期間

28日

総クール数

6クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ブレンツキシマブ ベドチン(アドセトリス)	1.2mg/kg	輸液100mL	30分	d1, 15
ドキシソルピジン	25mg/m <sup>2</sup>	輸液適量 計100mL	30分	d1, 15
ビンプラステン(エクザール)	6mg/m <sup>2</sup> (上限10mg)	輸液100mL	30分	d1, 15
ダカルバジン	375mg/m <sup>2</sup>	AQ10mL/Vで溶解 輸液500mLに希釈	3時間	d1, 15

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1, 15 ①グラニセトロン3mg/バッグ+デキサート13.2mg(15-30min) ②ドキシソルピジン25mg/m <sup>2</sup> +輸液適量(30min) ③エクザール6mg/m <sup>2</sup> +輸液100mL(30min) ④ダカルバジン375mg/m <sup>2</sup> +注射用水10mL/V+輸液500mL(3hr) ※点滴経路全般を遮光 ⑤生食50mL(フラッシュ用) ⑥ヒドロコルチゾン200mg+ポララミン5mg+生食100mL(15-30min) ⑦アドセトリス1.2mg/kg+注射用水10.5mL/V(溶解)+輸液100mL(30分) ⑧生食50mL(フラッシュ用)