

レジメン名

Denileukin Diftitox

出典 レミトロ適正使用ガイド2022年4月作成

実施部署区分

☒入院 ☒外来 ☐処置

対象疾患

PTCL、CTCL

☒再発・難治
☐補助療法(術前・術後)
☐初発
☐

投与減量の基準

その他	副作用等により、2サイクル連続で次サイクルの投与を延期した場合、6 μ g/kgに減量(6 μ g/kgに減量後、さらに減量が必要な場合は投与中止)
-----	--

投与中止の基準(サイクル開始時)

ALB	3.0g/dL未満	T-bil	1.8mg/dLを超える
ALT	135IU/Lを超える	AST	120IU/Lを超える
その他	Grade3以上の副作用		

投与中止の基準(各サイクルd2-5の開始前)

ANC	1,000/mm ³ 未満	PLT	5万/mm ³ 未満
Hb	8.0g/dL未満		
ALB	2.0g/dL未満	T-bil	3.6mg/dLを超える
ALT	225IU/Lを超える	AST	200IU/Lを超える
その他	Grade3以上の副作用(リンパ球現象、電解質異常、意義がないと判断される臨床検査値異常を除く)		

上記を認めた場合Grade2以下(低アルブミン血症はGrade1以下)に回復するまで休薬

1クール期間 21日

総クール数 8クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
デニロイキン ジフチトクス(レミトロ	9 μ g/kg	NS50mL	1時間	d1-5
3 μ g/mL以上(50倍希釈まで)の濃度になるよう希釈				

1日投与順
(経時的にプレマディケーション・ポストディケーション、
溶解液まで含む)

day1
①アセリオ500mg+ボララミン5mg+デキサート6.6mg(15min)
②生食250mL(30min)
※毛細血管漏出症候群を軽減させるため
③レミトロ9 μ g/kg+注射用水2.1mL/V(150 μ g/mL)+生食50mL(1hr)
3 μ g/mL以上(50倍希釈まで)の濃度になるよう希釈
インラインフィルターを使用しない
④生食250mL(30min)
※毛細血管漏出症候群を軽減させるため