

レジメン名

Nivolumab(q4w)

出典 オブジーボ適正使用ガイド単剤療法版2021年12月作成

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

悪性黒色腫

- 進行・再発
- 補助療法(術後)
-
-

投与減量の基準

その他			

投与中止の基準

AST	120IU/Lを超える	ALT	120IU/Lを超える
T-bil	1.8mg/dLを超える		
Cr	6.48(女性は4.8)mg/dLを超えるかつベースライン値の1.5倍超		
その他	Grade1以上の肺炎、Grade2以上の下痢・大腸炎・神経毒性・心筋炎、Grade3以上の発疹、症候性の甲状腺機能低下症・甲状腺中毒・下垂体障害・副腎障害、1型糖尿病、副腎クリーゼの疑い		

1クール期間 28日

(次のクールまでの標準期間)

総クール数

根治切除不能: PDまで
術後補助: 12か月まで

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ニボルマブ(オブジーボ)	480mg/body	輸液100mL	30分	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②オブジーボ480mg/body+輸液100mL インラインフィルターを用いて投与 (30分)
③生食50mL(フラッシュ用)