

レジメン名

Ipilimumab

出典 ヤーボイ添付文書2021年5月改訂

## 実施部署区分

入院
 外来
 処置

対象疾患

悪性黒色腫

進行・再発  
補助療法(術後)  
  


## 投与減量の基準

その他			

## 投与中止の基準

AST	120IU/L以上	ALT	135IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上		
Cr	1.08mg/dL超かつベースライン値の1.5倍超		
その他	Grade2以上の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く) Grade3以上の皮膚障害 症候性の内分泌障害 局所的な免疫抑制療法が有効でないGrade2以上の眼障害		

1クール期間 21日

総クール数 4クール

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
イピリムマブ(ヤーボイ)	3mg/kg	輸液30mL <sup>※</sup>	90分	day1
※希釈後の点滴溶液中のヤーボイの最終濃度が1~4mg/mLになるよう調製 250mg以下の場合: 生理食塩液または5%ブドウ糖液50mLから20mLを抜き取り30mLとした輸液バッグにヤーボイ3mg/kgを注入し調製 250mgを超える場合: 生理食塩液または5%ブドウ糖液100mLから70mLを抜き取り30mLとした輸液バッグにヤーボイ3mg/kgを注入し調製				

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食50mL(ルート確保用)
②ヤーボイ3mg/kg+輸液(50mL)30mL <sup>※</sup> (90分) インラインフィルター(0.2~1.2µm)を用いて投与
③生食50mL(フラッシュ用)