

レジメン名

doxorubicin

出典 J Clin Oncol.1995;13(1):1537-1545
Lancet.1997;350:911

実施部署区分

入院
 外来
 処置

悪性軟部腫瘍

進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

その他			

1クール期間 21日
(次のクールまでの標準期間)

総クール数 6クール

投与中止の基準

WBC	※2000/mm ³ 未満	PLT	※5万/mm ³ 未満
ANC	1000/mm ³ 未満	T-bil	※3mg/dL以上
AST(GOT)	200IU/L以上	ALT(GPT)	200IU/L以上
その他	総投与量:475mg/m ² まで ※中止基準が出典と異なるが、遠藤医師より Grade3以上の血液毒性と肝障害で登録と確認。		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ドキソルビシン	75mg/m ²	輸液適量 計100mL	全開	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①アロキン0.75mgハッグ+デキサート6.6mg(15分) ②ドキソルビシン75mg/m ² +輸液適量(15分) ③生食50mL(フラッシュ用)