

レジメン名

Trabectedin

出典 ヨンデリス適正使用ガイド2016年6月作成
Lancet Oncol 2015;16:406-416

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

悪性軟部腫瘍

進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

ANC	500/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満
ALP	850IU/L以上	T-bil	1.5mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上※	ALT(GPT)	100IU/L以上※
その他	※本剤投与後21日目以降で基準を超える場合 発熱・感染を伴うANC 500/mm ³ 未満、Grade3以上の非血液毒性。 上記のいずれかを認めるとき、下記を目安に減量。 1.2mg/m ² →1.0mg/m ² →0.8mg/m ² →中止		

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Hb	9.0g/dL未満	T-bil	1.5mg/dL以上
AST(GOT)	100IU/L以上	ALT(GPT)	100IU/L以上
その他	Ccr:30mL/min以下、ALP:850IU/L以上、 アルブミン:2.5g/dL未満		

1クール期間 21日

総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
トラベクテジン(ヨンデリス)	1.2mg/m ²	NS500mL	24時間	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶液まで含む)
day1 ①アロキシバック0.75mg+デキサート16.5mg (15分) ②生食100mL(30分)※必要に応じて短縮可 ③ヨンデリス1.2mg/m ² +生食500mL(24時間) ④生食50mL(フラッシュ用)