

レジメン名 weekly BD(注射)

出典 ベルケイド適正使用ガイド2012年12月作成
ベルケイド添付文書2012年12月改訂

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患 多発性骨髄腫
進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

その他	Grade3以上の末梢神経障害や神経因性疼痛が発現した場合には、回復するまで休薬。その後、減量して再開。減量の目安は以下の通り。 1.3mg/m ² →1.0mg/m ² →0.7mg/m ²		

1クール期間 28日* 総クール数 PDまで

(次のクールまでの標準期間)
※出典では初発の場合42日、再発の場合35日で1クールだが、医師と協議の上で休薬期間なしとした。

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
Hb	8.0g/dL未満	AST,ALT	100IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上		
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	NS適量	皮下注射	d1, 8, 15, 22
デキサメタゾン	33mg/body	NS50mL	15-30分	d1, 8, 15, 22

1日投与順
(経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、溶解液まで含む)

day1, 8, 15, 22
 ①デキサート33mg+生食50mL(15-30min)
 ②ベルケイド1.3mg/m²+生食適量(皮下注射)