

レジメン名 BTB

出典 ベルケイド適正使用ガイド2012年12月作成
Cancer 2010;116:3143-51.

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

多発性骨髄腫

進行・再発※
補助療法(術前・術後)
初発

※海外では初発に対して有効性を認めているが、日本ではサレドに初発の適応がないため進行・再発で登録。

1クール期間 21日 総クール数 8コース
(次のクールまでの標準期間)

投与減量の基準

その他	Grade3以上の末梢神経障害や神経因性疼痛が発現した場合には、回復するまで休薬。その後、減量して再開。減量の目安は以下の通り。 1.3mg/m ² →1.0mg/m ² →0.7mg/m ²		

投与中止の基準

ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満
Hb	8.0g/dL未満	AST,ALT	100IU/L以上
T-bil	1.8mg/dL以上		
その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
ボルテゾミブ(ベルケイド)	1.3mg/m ²	NS適量	皮下注射	d1, 4, 8, 11
サリドマイド	100mg/body	分1	経口	d1-21
デキサメタゾン	40mg/body	分1-2	経口	d1-4, 9-12

1日投与順 (経時的にプレメーション・ポストメーション、 溶解液まで含む)
day1-21のうち3剤投与日は以下の通り d1-4, d9-12 ①レナデックス40mg(分1-2で昼までに内服) d1, 4, 8, 11 ②ベルケイド1.3mg/m ² +生食適量(皮下注射) d1-21 ③サレド100mg(寝る前)