

レジメン名

DT-PACE
---------

出典 J Clin Oncol 21:2732-2739.

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

多発性骨髄腫
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

その他			

1クール期間   
(次のクールまでの標準期間)

総クール数

投与中止の基準

その他			

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
サリドマイド(サレド)	100mg/body	経口		連日
デキサメタゾン(レナデックス)	40mg/body	経口		day1-4
シスプラチン	10mg/m <sup>2</sup>	生食500mL	24時間	day1-4
ドキシソルピシン	10mg/m <sup>2</sup>	輸液500mL	24時間	day1-4
シクロホスファミド(エンドキサン)	400mg/m <sup>2</sup>	輸液500mL	24時間	day1-4
エトポシド(ラステット)	40mg/m <sup>2</sup>	輸液500mL	24時間	day1-4

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-4 ① グラネセロン3mgハック(30分) ② シスプラチン10mg/m <sup>2</sup> + 生食500mL(24時間) ③ 生食50mL(day5のみ)
<側管> ① 生食50mL(ルート確保用)(day1のみ) ② ドキシソルピシン10mg/m <sup>2</sup> + エンドキサン400mg/m <sup>2</sup> + 輸液500mL(24時間)
<側管> ① 生食50mL(ルート確保用)(day1のみ) ② ラステット40mg/m <sup>2</sup> + 輸液500mL(24時間) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与
<内服> サレド100mg(分1寝る前) 連日 day1-4 レナデックス40mg(分1-2で昼までに内服)