

レジメン名 CyBorD

出典 ベルケイド適正使用ガイド2012年12月作成
Leukemia.2009 July;23(7):1337-1341

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患 多発性骨髄腫
進行・再発
補助療法(術前・術後)
初発

投与減量の基準

その他 Grade3の血液毒性とGrade1の膀胱炎が起きたら、day22のエンドキサンは中止。次コース以降もエンドキサンは投与期間短縮したままで、同じ副作用が出たら、day15も中止。その後も同じ副作用が出たらday8も中止。
 Grade3以上の末梢神経障害や神経因性疼痛が発現した場合には、回復するまで休薬。その後、減量して再開。減量の目安は以下の通り。
 1.3mg/m²→1.0mg/m²→0.7mg/m²

投与中止の基準

| | | | |
|-------|-------------------------|---------|------------------------|
| ANC | 1000/mm ³ 未満 | PLT | 10万/mm ³ 未満 |
| Hb | 8.0g/dL未満 | AST,ALT | 100IU/L以上 |
| T-bil | 1.8mg/dL以上 | Cr | 3.5mg/dL以上 |
| その他 | Grade3以上の膀胱炎 | | |

1クール期間 28日 総クール数 12クール
 (次のクールまでの標準期間)

| 薬剤名・略号 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与速度(時間) | 投与日(d1、d8等) |
|-------------------|----------------------|------|----------|-------------|
| ボルテゾミブ(ベルケイド) | 1.3mg/m ² | NS適量 | 皮下注射 | d1、4、8、11 |
| シクロホスファミド(エンドキサン) | 300mg/m ² | 経口 | | d1、8、15、22 |
| デキサメタゾン(レナデックス) | 40mg/body | 経口 | | d1、4、8、11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1日投与順
 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、
 溶解液まで含む)

day1、4、8、11
 ①ベルケイド1.3mg/m²+生食適量(皮下注射)
 day1、8、15、22
 ②エンドキサン300mg/m²
 day1、4、8、11
 ③レナデックス40mg