

レジメン名

DBd点滴静注

出典 **ダラザレックス適正使用ガイド2021年10月作成**
MMY3004試験

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

多発性骨髄腫
進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与中止の基準(ダラザレックス)

Infusion reaction	Grade1.2:回復後、再投与可 Grade3:回復後、再投与可(3回出現で投与中止) Grade4のInfusion reaction:中止 ※発現時の半分以下の速度で投与再開。再発なければ次コース以降、1時間あたり50mL/hrずつ増量可。(MAX200mL/hr)
-------------------	---

投与中止の基準

	ANC	PLT	その他
	500/mm ³ 未満 発熱性好中球減少症、 感染症を伴うANC減少		2.5万/mm ³ 未満 5万/mm ³ 未満 (出血を伴う場合)
その他	ダラキューロ Infusion reaction Grade1.2:回復後、再投与可 Grade3:回復後、再投与可(3回出現で投与中止) Grade4のInfusion reaction:中止 Grade3以上の非血液毒性(ただし、下記を除く) ・7日以内に制吐薬に反応したGrade3の悪心又は嘔吐 ・7日以内に止瀉薬に反応したGrade3の下痢 ・ペースライン時に認められていた、又はダラキューロ最終投与後7日未満持続するGrade3の疲労又は無力症 ・多発性骨髄腫の徴候に伴うGrade3の疼痛 ベルケイド 疼痛を伴うGrade2又はGrade3以上の末梢神経障害や神経障害性疼痛		

投与減量の基準(ベルケイド)

	ANC	PLT	その他
	1000/mm ³ 未満 500/mm ³ 未満の 再発		2.5万/mm ³ 未満 5万/mm ³ 未満 (出血を伴う場合)
その他	疼痛を伴うGrade2又はGrade3以上の末梢神経障害や神経障害性疼痛 減量の目安:1.3mg/m ² →1.0mg/m ² →0.7mg/m ² →投与中止		

1クール期間 1-8サイクル:21日 9サイクル以降:28日 総クール数 PDまで
(次のクールまでの標準期間)

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
ダラツムマブ(ダラザレックス)	16mg/kg	輸液適量	50mL/時より開始	day1、8、15(1-3サイクル)
ダラツムマブ(ダラザレックス)	16mg/kg	輸液適量	100mL/時より開始	day1(4-8サイクル)
ダラツムマブ(ダラザレックス)	16mg/kg	輸液適量	100mL/時より開始	day1(9サイクル以降)
ボルテゾミブ(ベルケイド)	1.3mg/m ²	NS適量	皮下注射	day1、4、8、11(1-8サイクル)
デキサメタゾン(デキサート)	19.8mg/body	前投薬に混合	15分	day1、8、15 [*] (1-3サイクル)
デキサメタゾン(レナデックス)	20mg/body	経口	分1-2 昼までに内服	day2、4、5、9、11、12 (1-3サイクル)
デキサメタゾン(デキサート)	19.8mg/body	前投薬に混合	15分	day1(4-8サイクル)
デキサメタゾン(レナデックス)	20mg/body	経口	分1-2 昼までに内服	day2、4、5、8、9、11、12 (4-8サイクル)
デキサメタゾン(デキサート)	19.8mg/body	前投薬に混合	15分	day1 [*] (9サイクル以降)
※前投薬として				

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ポスト Medikation、 溶解液まで含む)
<1-3サイクル> day1、8 ①アセリオ1000mg+デキサート19.8mg+ボララミン5mg(15分) ②生食100mL (60分) ③ダラザレックス16mg/kg+輸液総量1000mL(50mL/時より開始※) インラインフィルター使用 ④生食50mL (フラッシュ用) ⑤ベルケイド1.3mg/m ² +生食適量(皮下注射) day4、11 ①ベルケイド1.3mg/m ² +生食適量(皮下注射) day15 ①アセリオ1000mg+ボララミン5mg+デキサート19.8mg [*] (15分) ②生食100mL (60分) ③ダラザレックス16mg/kg+輸液総量500mL(100mL/時より開始※) インラインフィルター使用 ④生食50mL (フラッシュ用) <4-8サイクル> day1 ①アセリオ1000mg+デキサート19.8mg+ボララミン5mg(15分) ②生食100mL (60分) ③ダラザレックス16mg/kg+輸液総量500mL(100mL/時より開始※) インラインフィルター使用 ④生食50mL (フラッシュ用) ⑤ベルケイド1.3mg/m ² +生食適量(皮下注射) day4、8、11 ①ベルケイド1.3mg/m ² +生食適量(皮下注射) <9サイクル以降> day1 ①アセリオ1000mg+ボララミン5mg+デキサート19.8mg [*] (15分) ②生食100mL (60分) ③ダラザレックス16mg/kg+輸液総量500mL(100mL/時より開始※) インラインフィルター使用 ④生食50mL (フラッシュ用) ※速度の詳細は添付文書参照・インラインフィルター