

レジメン名

DCEP

出典 Ann Hematol (2014) 93:99-105

実施部署区分

<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 処置
--	--	-----------------------------

対象疾患

多発性骨髄腫
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 補助療法(術前・術後) <input type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/>

投与減量の基準

CLcr	60mL/min以下 (ODDPを50%減量)
	50mL/min以下 (GPA・ETPを25%減量)
	10mL/min以下 (GPA・ETPを50%減量)
その他	

1クール期間
(次のクールまでの標準期間)

総クール数

投与中止の基準

CLcr	30mL/min以下 (GDDP)
その他	

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
デキサメタゾン(レナデックス)	40mg/body	経口※		day1-4
シスプラチン	10mg/m ²	生食500mL	24時間	day1-4
シクロホスファミド(エンドキサン)	400mg/m ²	輸液500mL	24時間	day1-4
エトポシド(ラステット)	40mg/m ²	輸液500mL	24時間	day1-4
※デキサメタゾンは、レナデックス40mg内服もしくはデキサート39.6mgを前投薬に混合し投与。				

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1-4 ① グラニセトロン3mgハック(30分) ② シスプラチン10mg/m ² + 生食500mL(24時間) ③ 生食50mL(day5のみ) <側管> ① 生食50mL(ルート確保用)(day1のみ) ② エトキサン400mg/m ² + 輸液500mL(24時間) <側管> ① 生食50mL(ルート確保用)(day1のみ) ② ラステット40mg/m ² + 輸液500mL(24時間) DEHPフリーのインラインフィルターを用いて投与 ※デキサメタゾンは、レナデックス40mg内服 もしくはデキサート39.6mgを前投薬に混合し 投与。