レジメン名		weekly n	ab-PTX				出典		トン適正使用ガイド 20 troenterol Hepatol 2017;	
						実施部署	区分			
						■入院	■外来	□処置		
						## F >> =	10##			
対象疾患	胃癌]	投与減量 ANC	[の基準 500/mm ³ 未満	PLT	2.5万/mm ³ 未満	
	■進行・再発 □補助療法(術前・ <u>術後</u>) □					その他	発熱性好中球減少症、G3以上の末梢神経障害 100mg/m²→80mg/m²→60mg/m²			
						投与中山	-の基準			
1ク―ル期間	28日		総クール数	PDまで	7	ANC	1000/mm ³ 未満	PLT	7.5万/mm ³ 未満	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 期間)			J	その他				
薬剤名•略号		1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投	与日(d1、d	8等)	(経時的)	1日投与順 ニプレメディケーション・ポ。 溶解液まで含む	ストメテ・ィケーショ
リタキセル(アブ	ラキサン)	100mg/m ²	生食適量	30分	day1.8.15			day1.8.15 ①デキサ	ート6.6mg+生食50r	mL(15分)
									キサン100mg/m²+5 インフィルターを 使月	

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度 (時間)	投与日(d1、d8等)
ナブパクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m ²	生食適量	30分	day1.8.15

(経時的にプレジディケーション・ボストメディケーション、 溶解液まで含む) day1.8.15 ①デキサート6.6mg+生食50mL(15分) ②アブラキサン100mg/m²+生食(30分) インラインフィルターを使用せずに投与 ③生食50mL(全開)