

レジメン名

VP-16+CDDP

出典 JCOG1213試験
JCO.20(14);3054-60,2002
NEJM,340;265-271,1999

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

NET G3またはNEC
進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他				

1コース期間

21日

総コース数

PDまで

(次のコースまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Hb	9.0g/dL未満	GLcr	60mL/min未満
AST,ALT	100IU/L以上*	T-bil	1.5mg/dL以上
その他	GR: 1.3mg/dL以上 ※肝転移がある場合と肝臓NECの場合は150IU/L以上		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1、d8等)
エトポシド	100mg/m ²	輸液500mL	2時間	day1-3
シスプラチン	80mg/m ²	生食500mL	2時間	day1

1日投与順 (経時的にプレ Medikation・ホスト Medikation、 溶解液まで含む)
day1 ①生食500mL (1時間) ②デキサート9.9mg+アロキシ0.75mg/バッグ(15-30分) ③エトポシド100mg/m ² +輸液250mL(2時間) ④ソルデム3A 500mL+硫酸Mg 20mL(1時間) ⑤マンニット15% 500mL(1時間) ⑥シスプラチン80mg/m ² +生食適量(2時間) ⑦ソルデム3A 500mL+フロセミド20mg(90分) ⑧生食 500mL(90分) ⑨ソルデム3A 500mL(90分)
day2、3 ①デキサート6.6mg+生食100mL(15-30分) ②エトポシド100mg/m ² +輸液500mL(2時間) ③生食50mL(フラッシュ用)
<内服> day1-3 アプレピタントカプセルセット