

レジメン名

CPT-11+CDDP

出典 Cancer Sci 2014;105:1176-1181
JCOG1213試験

実施部署区分

入院 外来 処置

対象疾患

NET G3またはNEC
進行・再発
補助療法(術前・術後)

投与減量の基準

その他			

1コース期間

28日

総コース数

PDまで

(次のコースまでの標準期間)

投与中止の基準

ANC	1500/mm ³ 未満	PLT	10万/mm ³ 未満
Hb	9.0g/dL未満	CLcr	60mL/min未満
AST,ALT	100IU/L以上※	T-bil	1.5mg/dL以上
その他	GR: 1.3mg/dL以上 ※肝転移がある場合と肝臓NECの場合は150IU/L以上		

薬剤名・略号	1日投与量	投与方法	投与速度(時間)	投与日(d1, d8等)
イリノテカン	60mg/m ²	輸液250mL	90分	day1, 8, 15
シスプラチン	60mg/m ²	生食500mL	2時間	day1

1日投与順 (経時的にプレメタキソン・ホストメタキソン、 溶解液まで含む)
day1 ①生食500mL(1時間) ②デキサート9.9mg+アロキシ0.75mg/バッグ(15-30分) ③イリノテカン60mg/m ² +輸液250mL(90分) ④ソルデム3A 500mL+硫酸Mg 20mL(1時間) ⑤マンニト15% 500mL(1時間) ⑥シスプラチン60mg/m ² +生食適量(2時間) ⑦ソルデム3A 500mL+フロセミド20mg(90分) ⑧生食 500mL(90分) ⑨ソルデム3A 500mL(90分)
day8, 15 ①デキサート6.6mg+アロキシ0.75mg/バッグ(15-30分) ②イリノテカン60mg/m ² +輸液250mL(90分) ③生食50mL(フラッシュ用)
<内服> day1, 8, 15から4日間 ウルソデオキシコール酸(100)3錠 分3毎食後 炭酸水素ナトリウム 1.8g 分3毎食後 (遅発性下痢の予防目的)
day1-3 アプレピタントカプセルセット